

디자인 사양 (시방서)		대원제약
작성자 / 신규 작성일	진혜란	
제품명	알마게이트 500정 라벨	
규격 (장폭고)(mm)	170 x 85 (mm)	
인쇄도수	별색 3도	
	■ 먹	
	■ DIC 581	
	■ PANTONE Cool gray 10	
용지 (g)	제조사에 따름	
코팅 / 후가공	제조사에 따름	
개정내용	제조사변경	
개정번호 / 개정일자	V.0004	2019.07.05.

담당		개발	Q.A	자원팀	

500정

170*85



대원
알마게이트정
500 정

일반의약품
조제용
분류번호 234 : 제산제



성분·함량 : 이 약 1정 중
·유효성분 : 알마게이트(KP) 500.0 mg
·첨가제 : 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈
| 성상 : 흰색의 장방형 정제
| 효능·효과 : 다음 질환의 제산작용 및 증상의 개선 : 위·십이지장궤양, 위염, 위산과다, 속쓰림, 구역, 구토, 위통, 신트림
| 용법·용량 : 성인 및 12세 이상의 소아 : 알마게이트로서 1회 1g을 1일 3회, 식후 30분 ~ 1시간에 씹어서 경구 복용합니다. 필요시 취침 전에 1회 더 복용할 수 있습니다.

대원제약주식회사

사용상의 주의사항 : 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다. 1) 이 약 또는 이 약의 구성 성분에 대해서 과민반응이 있는 환자 2) 알츠하이머병 환자 3) 치질 환자 4) 체액 저류(부기) 환자 5) 임신 중독증 환자 6) 설사 환자 7) 진단되지 않은 소화 기관 출혈 환자 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다. 테트라사이클린계 항생물질(함께 복용시 흡수를 억제할 수 있음) 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 : 이 약의 함작작용 또는 소화관내 체액의 pH 상승에 의해 함께 복용하는 약물의 흡수·배설에 영향을 줄 수 있으므로 신중히 복용합니다. (1) 비스테로이드소염진통제(NSAD), 궤양 치료제, 디기탈리스 제제, 클로르프로마진, 란소프라졸, 프레드니솔론, 페니실린, 퀴놀론, 철(Fe)염 제제 : 흡수를 감소시킬 수 있으므로 2 ~ 3 시간 간격을 두고 복용합니다. (2) 살리실산염 : 신장의 배설을 증가시킵니다. 2) 신장에 환자 : 마그네슘 또는 알루미늄이온이 오랜 기간 동안에 걸쳐 공복에 축적될 수 있습니다. 심한 신장에 환자에게는 권고되지 않습니다. 3) 신체 허약자, 인 함량이 낮은 식이 요법 실시자, 소화 흡수 장애가 있는 사람 : 이 약의 알루미늄염이 인 흡수를 감소시키므로 장기간 복용할 경우, 혈중 인산염 함량 감소 및 뼈의 무기질 침착장애를 야기할 수 있습니다. 4) 고령자 5) 혈액구토 또는 흑색 대변 등과 같은 소화기관 출혈 증상이 있는 환자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다. 1) 소화기계 : 이 약을 복용하는 동안 변비 또는 설사 2) 2 주정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다. 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다. 3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다.

| 저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 약품은 KGMF(한국약품제조 및 공급자)의약품, 약제업에서 생산되어 엄격한 품질 관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간 또는 사용 기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 이상한 냄새를 구할 경우 약국 등 판매업소에 환하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소량의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 25000 내봉은 유효기간입니다. (www.daewonpharm.co.kr) 나 전화 : (02)-451-4277에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어(용량 및 기타 자세한 약물관정보는) 의약품안전센터(<https://medrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오. ※ 부속품 : 포장지, 사용 설명서, 한국약제학회(대한약제학회) (064-4522) ※ 작성일자 : 2019. 07. 05

제조번호 :
사용기한 :

| 제조/판매자
Daewon 대원제약
본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

| 제조자
(주)다나젠
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19,
15층 1503호

