

| 용법 · 용량

성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 1g, 1일 3회 복용합니다.
소아 (6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 1g, 1일 2회 복용합니다.
단, 4주 이상 투여하지 않습니다.

| 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.
6세 미만의 유아
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의해야 합니다. 상담 시에는 가능한 이 첨부문서를 소지 하도록 합니다.
1) 임부 (동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신중에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
2) 수유부 (유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직합니다.)
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 지켜야 합니다.
2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.
3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타 날 수 있습니다.
4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

20 mL x 21 포

일반의약품 조제용

분류번호 399 : 따로 분류되지 않는 대사성 의약품



뜯는 곳 ◀

| 성분 · 함량 : 이 약 1포(20 mL) 중

- 유효성분 : 시트룰린말산염(별규).....1.00 g
- 첨가제 : (보조제) 벤조산나트륨 0.012 g / (기타) 수산화나트륨, 오렌지엡텐스#46-FI, 자일리톨, 잔탄검, 정제수

| 성상 : 알루미늄 호일 파우치에 든 오렌지향의 무색 내지 옅은 황색의 액

| 효능 · 효과 : 기능 무력증의 보조치료

| 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

| 제조번호 :

| 사용기한 :

바코드 확인

※ 본 의약품은 KDMF의약품제조 및 품질관리기준(의약품제조 및 품질관리기준)에 따라 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com) 나 전화(080-697-8272)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(www.medicines.go.kr)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약물안전관리원 (0644-6223) • 작성일자 : 2020. 01. 16.

| 제조회사

Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 현호대로 396
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

| 제조의뢰자

다나젠

서울특별시 금천구 가산디지털1로 19,
15층 1501호~1503호