

# 아픈 목엔 - 요를레이

트로키

## 성분 · 함량 : 1트로키 중

- 유효성분 : dL-메틸에페드린염산염(KP)..... 12.5 mg
- 구아아를실폰산칼륨(USP)..... 45 mg
- 노스카핀(KP)..... 10 mg
- 세틸피리다닌염화물수화물(USP)..... 1 mg
- 첨가제(동물유래성) : 황색소료
- 첨가제(동물유래성) : 유당수화물(소의 우유)
- 기타첨가제 : D-만니톨, L-멘톨, 레몬맛분말(14215), 레몬향코톤, 모과향 분말, 분당, 스테아르산마그네슘, 아세살필칼륨, 아스파탐, 이소말트, 페퍼민트, 포바돈

## 성 상 : 미황색(연노랑)의 구멍이 뚫린 원형 트로키제

## 효능 · 효과

기침, 가래, 천식, 구내염(입안염), 편도염, 인후두(목구멍)염으로 인한 목삼목의 불쾌감·인후(목구멍)통증이 부여옴

## 용법 · 용량

다음 복용량을 씹거나 삼키지 말고, 입안에서 천천히 녹여서 복용합니다.

- 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1정씩 1일 6회 (복용간격 2시간 이상)
- 만 11세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정씩 1일 4회 (복용간격 3시간 이상)
- 만 8세 이상~만 11세 미만 : 1회 1정씩 1일 3회 (복용간격 4시간 이상)

## 사용상의 주의사항

### 1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에게 투여하지 말 것

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO억제제(형용술제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 된다.

### 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

다른 전해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제

### 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노년), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

## 4) 수유부

5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

## 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 2주 이상 지속되는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

## 7) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람

8) 이 약은 황색소료(타르트트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

## 5. 다음과 같은 경우, 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적(종혈피)어 붉어짐), 가려움, 구역구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면

2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

## 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3) 만 7세 이하의 영(갓난아기)유아에게는 시럽제를 복용시킬 것
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것

## 7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

## 저장방법 : 차광기밀용기, 실온(1~30 ℃)보관

## 사용기한 : 포장재 측면 표시일까지

## 포장단위 : 12트로키(6트로키/PTP×2)

※ 본 의약품은 KCMF의약품제조 및 품질관리기준(적격인증)에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ※ 작성일자 : 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.daewon-pharm.com](http://www.daewon-pharm.com))나 전화(080-497-6273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://medrug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하십시오. ※ 무작위보고 및 피해구제 신청 : 한국약물안전관리센터 (644-6223) 작성일자 : 2020. 04. 27.

## 제조업체

# Daewon 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제암로1길 24

## 제조사

## 경남제약(주)

충청남도 아산시 신창면 서부남로730번길 49