

사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 임신 초기 3개월 이내의 환자
- 2) 수유부
- 3) 간 질환자, 알콜 중독자, 간질 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 3) 의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부 문서를 소지할 것

- 1) 경미한(가벼운) 위장장애, 두통, 안면홍조가 나타나는 경우
- 2) 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 식욕부진, 구역, 구토 등의 증상이 나타나는 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 급성 치질 환자에게 사용하며 다른 항문질환에까지 효과가 나타나는 것은 아님을 주의한다. 증상이 신속히 개선되지 않는 경우에는 항문과 전문의의 진료를 받은 후 치료를 수정한다.
- 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 3) 이 약은 경구용으로만 복용하고 주사용으로 사용하지 않는다.

5. 소아에 대한 투여

소아에는 투여하지 않는다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 기형발생은 나타나지 않았으나, 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 신중히 투여한다.
- 2) 이 약이 모유로 이행되는지 여부는 밝혀져 있지 않다. 따라서 수유 중에는 사용하지 않는다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광(햇볕)을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.