

# 메디놀 주사액

(프리디놀메실산염)

성분 · 함량 : 이 약 1 mL 중

- 유효성분 : 프리디놀메실산염(KP) ..... 2 mg
- 기타 첨가제 : 염화나트륨, 주사용수, 타우린

성상 : 무색투명한 액이 든 갈색앰플제

효능 · 효과

근골격계 질환에 수반되는 동통성 연속 : 요배통증, 경관완 증후군, 견관절주위염, 변형성 척추증

용법 · 용량

성인 : 메실산프리디놀로서 1회 2 mg 1일 1회 근육 또는 정맥주사합니다.  
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

사용상의 주의사항

## 1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어 부작용을 초래할 수 있으므로 사용시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의합니다.

## 2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 녹내장 환자(항콜린작용에 의해 안압을 상승시킬 수 있습니다.)
- 3) 전립선비대에 의한 배뇨곤란 환자(항콜린작용에 의해 배뇨장애를 악화시킬 수 있습니다.)
- 4) 중증의 심질환 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 5) 마비성 장폐색증 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 6) 거대 결장증 환자
- 7) 급성 폐부종 환자
- 8) 빈맥 환자
- 9) 중증의 동맥경화증 환자
- 10) 위장관부위 협착 환자

## 3. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

간·신장에 환자

## 4. 부작용

- 1) 과민증 : 발진, 두드러기, 드물게 아나필락시양 증상, 속유사증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.
- 2) 정신신경계 : 때때로 어지러움, 비틀거림, 실신, 졸음, 불안, 환각, 무력감, 권태감 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 합니다.
- 3) 골격근 : 드물게 근이완, 근무력증, 장시간 정좌불능 등이 나타날 수 있습니다.
- 4) 소화기계 : 구갈, 드물게 구역·구토 등이 나타날 수 있습니다.
- 5) 피부 : 한선분비감소, 홍반
- 6) 눈 : 시조절장애, 협우각형 녹내장이 나타날 수 있습니다.

## 5. 일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의합니다.

## 6. 상호작용

- 1) 다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이하게 투여하는 경우에는 감량하는 등 주의합니다. : 페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경 억제제, MAO 저해제
- 2) 다음 약물과의 병용에 의해 이 약의 항콜린작용이 증강될 수 있습니다. : 아만타딘, 퀴닌
- 3) 도파민 길항제 (메토클로프라마이드 등)와 병용시 위장관 작용을 방해시킵니다.

## 7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 2) 이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

## 8. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.

## 9. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의합니다.

## 10. 적용상의 주의

- 1) 이 약의 주사는 경구투여가 불가능한 경우에만 사용합니다.
- 2) 정맥주사
  - (1) 생리식염주사액 또는 5 % 포도당 주사액에 섞어 사용하는 것이 바람직하나 부득이하게 단독 주사할 경우에는 주사속도를 가능한 느리게 합니다.
  - (2) 정맥주사는 환자를 옆으로 눕히고 투여합니다.

저장방법 : 차광밀봉용기, 건냉암소

사용기한 : 외부포장 참조

포장단위 : 1mL/앰플 X 50

※ 본의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.  
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 ([www.daewonpharm.co.kr](http://www.daewonpharm.co.kr)) 나 전화 (080-497-8272) 에서 확인하실 수 있습니다.  
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요.  
\* 작성일자 : 2017. 08. 17.

제조판매원

**Daewon** 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24