

디자인 사양 (시방서)		대원제약
작성자 / 신규 작성일	진혜란	2016.07.26
제품명	콜대원콜드에스시럽 5포 카톤	
규격 (장폭고)(mm)	54 x 35 x 148(mm)	
인쇄도수	4도 옙셋 + 별색 1도 <div> <div></div> <div>먹</div> <div>PANTONE 199</div> </div>	
용지 (g)	CCP 300g	
코팅 / 후가공	유광라미네이팅	
개정내용	성분수정	
개정번호 / 개정일자	V.0002	2019.06.18.

[사용상의 주의사항]

1. **경고** 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 출을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. 2. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.** 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기와 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만3개월 미만의 영아(갓난아기) 4) MVO(약제제)항응고제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. **이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.** 진해거담제(기침·가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염·코염을 경구제, 말미약, 알레르기용약) 4. **이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 형위를 하지 않습니다.** 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000 mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다. 5. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 합니다.** 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역)나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이지홍준의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의합니다.) 2) 본인, 양친 또는 형제 중 누가 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 치료에 의해 알레르기 증상에: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장염: 눈의 통증, 눈이 침침함 등, 배뇨소변을 묽고란 등이 있는 사람, 고령자노인, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 6) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 여성, 수유부 가 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람당뇨와, 통풍과, 관절염과, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람: 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐결핵, 과도한 가래가 동반되는 기침 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 6. **다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.** 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우: 발진발적·종혈되어 붉어짐, 가려움, 구역구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨소변을 묽고란, 목마름(지속적이거나 심한, 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 아래의 중증심한 증상(중상)이 나타난 경우 ① 속이(나)팔락시(과민성 스크): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부점막만종후괴사(괴문스-존슨증후군), 중독성 표피파사용해(리얼증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적·종혈되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈정막에 나타날 수 있습니다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 황자)가 황색을 띄게 됨이 나타날 수 있습니다. ⑤ 간질성패렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다. ⑥ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 7. **가타 이 약의 복용시 주의할 사항** 1) 정해진 용량·용량을 잘 지킵니다. 2) 장기간 계속 복용하지 않습니다. 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다. 4) 복용시에는 음식물 섭취를 삼가주세요. 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피합니다. 6) 바르비탈계 약물, 삼합계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 8. **소아에 대한 투여** 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다. 9. **저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다. 3) 오염(잘못된 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.

[일반의약품] 114[해열·진통·소염제]

[성분·함량] 이 약 1포(20 mL) 중
·유효성분: 아세트아미노펜(KP) 325 mg, 클로르페니라민말산염(KP) 25 mg, 펜토 시메린시트르산염(KP) 8 mg, d-메틸에 페드린염산염(KP) 18 mg, 구아이페네신 (KP) 42 mg, 카페인무수물(KP) 25 mg
·첨가제: (보조제) 벤조산나트륨 12mg / (타르색소) 적색40호 / (7타) D-소르비톨 액, 농글리세린, 레몬에센스, 수크랄로스, 스테비온100에스, 시트르산, 시트르산 나트륨수화물, 아세살팔칼륨, 에플린드랑 514165, 에디트산, 나트륨수화물, 에탄올, 염화나트륨, 자일리톨, 진단검, 정제수, 포비돈 K30, 프로판글리콜
[성상] 알루미늄 호일 파우치에 든 빨간색의 방향성 감미의 시럽제
[효능·효과] 감기의 증상(코막힘, 재채기, 인후·목구멍통, 기침, 가래, 오한)을 줄이고, 열리는 증상, 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화
[용법·용량] 다음 1회 용량을 1일 3회 식후 30분에 복용, 만 15세 이상 1회 20 mL 만 11세 이상 - 만 15세 미만 1회 13 mL 만 7세 이상 - 만 11세 미만 1회 10 mL 만 3세 이상 - 만 7세 미만 1회 6.5 mL 만 2세 이상 - 만 3세 미만 1회 5 mL 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[제조번호]
[사용기한]
[포장단위] 20 mL/포 x 5
※ 복용 시 포장 단면에 배일 수가 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 본 의약품은 KOMP 품질 관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구매처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 대원제약 홈페이지(www.daewonpharm.co.kr)나 전화(080-497-8273)에서 확인하실 수 있습니다. 작성일자: 2019. 06. 18. V.0002



[제조판매원]
daewon 대원제약
 본사: 서울특별시 성동구 천호대로 386
 공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단 14/2



답 당	PM		개 발	Q.A	자원팀	생산부