

약의 구성성분. 다른 해열진통제, 감기와 복용 시 천식을 일으킬 적이 있는 사람 3) 만3개월 미만의 영아(간나이7기) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 3. **이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 않습니다.** 진해거담제(가래가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내부약(비염·코염)을 경구제, 말약, 알레르기 용액 4. **이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 않습니다.** 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 됩니다. 5. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.** 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간나이7기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구두를 수반하는 행동의 변화가 있다면 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의합니다.) 2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염·코염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨소변을 볼때 불편 등이 있는 사람 5) 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위무 불편감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나, 게양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 6. **다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.** **상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다.** 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 발진·발적·종혈되어 붉어짐, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨소변을 볼때 불편, 목아름 지속적이거나 심한, 어지러움 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증심한 증상 중 하나가 나타난 경우 ① 속이나 팔라시(과민성 쇼크) : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부점막인종후군(스티븐스-존슨증후군, 중증성표피괴사증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적·종혈되어 붉어짐, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신(피부, 인두, 눈, 점막)에 나타날 수 있습니다. ③ 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 흉통, 다수의 작은 농포와 같은 증후 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. ④ 천식 ⑤ 긴가늡(경증) : 전신의 나른함, 흥분(피부 또는 눈의 원시위)가 황색을 띄게 됨등이 나타날 수 있습니다. ⑥ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다. ⑦ 수도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 7. **7. 타 이 약의 복용시 주의할 사항** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜주세요. 2) 장기간 계속 복용하지 않습니다. 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다. 4) 복용시에는 음주하지 않습니다. 5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피합니다. 6) 바르비탈을 약물, 심한 경우 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 8. **8. 소아에 대한 투여** 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다. 9. **9. 저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다. 3) 오염·절단된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않습니다.



[일반의약품] 114[해열·진통·소염제]

[성분·함량] 이 약 1포(20 mL) 중
 • 유효성분 : 아세트아미노펜(KP) 325 mg,
 클로르페니라민말레산염(KP) 2.5 mg,
 카페인무수물(KP) 25 mg,
 수도에페드린염산염(KP) 30 mg
 • 첨가제 : (보존제) 벤조산나트륨 12 mg /
 (타르색소) 적색40호 / (7F)D-소르비톨 액
 농글리세린, 레몬에센스, 수크랄로스, 스테비온
 1000에스, 시트르산, 시트르산나트륨수화물,
 아세살팔칼륨, 에틸알코올, 에데트산
 나트륨수화물, 에탄올, 염화나트륨, 자일리톨,
 진단검, 정제수, 포비돈 K30, 프로판디올, 글리콜
[상징] 알라미늄 호일 파우치에 든
 빨간색의 방향성 감미의 시럽제
[효능·효과] 감기의 제증상(열, 코
 막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한
 [출고 및 유통] 중성, 발열, 두통, 관절통,
 근육통)의 완화
[용법·용량] 다음 1회 용량을 1일 3회
 식후 30분에 복용
 만 15세 이상 1회 20 mL
 만 11세 이상 - 만 15세 미만 1회 13 mL
 만 7세 이상 - 만 11세 미만 1회 10 mL
 만 3세 이상 - 만 7세 미만 1회 6.5 mL
 만 2세 이상 - 만 3세 미만 1회 5 mL
 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다.
 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를
 받습니다.
[저장방법] 가밀용기, 실온(5~30°C) 보관
[포장단위] 20 mL / 포 x 5
 ※ 복용 시 포장 단면에 배일 수가
 있으므로 주의하시기 바랍니다.

※ 본 약품은 KFDA(식품의약품안전처) 및 식품의약품안전처(의약품안전)에서 생산하여
 일정한 품질 관리를 통한 제품입니다. 만약 구입 시 유통기한 또는
 사용기간이 경과하였거나 변질, 변색 또는 이상한 증상을 구입한 약품 등
 판매업소에 대하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소의
 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 적정용량 이하 투여된 내용은 홈페이지
 이(www.daewonpharm.com)나, 전화(02-461-0222)에서 확인할 수
 있습니다. ※ 약의 유통기한은 기밀 기재된 약품 포장에 기재되어 있으며,
 (https://daewonpharm.com)에서 확인할 수 있습니다. ※ 부작용, 피하
 손상, 허혈성 대장염(전신적) (404-4223) · 작성일자: 2024. 11. 11. 00000

[사용상의 주의사항]

1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는
 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할
 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.
 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될
 수 있습니다. 2) 수도에페드린 함유 의약품(복합성
 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증
 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 흉통,
 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이
 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야
 합니다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지
 않습니다. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한
 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이

자 먹는 코감기약
콜대원
 노즈에스 시럽

Smart
cut

자 먹는 코감기약
콜대원
 노즈에스 시럽

코막힘

코막힘

재채기

20mL/
포 X 5

Daewon® 대원제약

Smart
cut

자 먹는 코감기약
콜대원
 노즈에스 시럽

코막힘

코막힘

재채기

20mL/포 X 5

[제조판매원]

Daewon® 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386

공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

[제조번호]
[사용기한]

담당	PM	개 발	Q.A	자원팀	생산부