짜 먹는 어린이 기침감기약

콜대원 키즈 코프시럽

Smart cut

Smart cut

짜 먹는 어린이 기침감기약

콜대원 키즈 코프시럽

딸기향 기침 / 가래 5mL/포 X 10

[성분·함량] 이 약 1포(5 mL) 중 **·유효성분 :** 펜톡시베린시트르산염(KP) 2.5 mg dl-메틸에페드린염산염(KP) 3.125 mg 구아이페네신(KP) 10.5 mg · **첨가제 :** (보존제) 벤조산나트륨 3 mg / (기타) 농글리세린, 딸기향 3104145, 수크랄로스, 스테비온1000에스, 시트르산, 시트르산나트륨수화물, 아세설팜칼륨, 에데트산나트륨수화물, 염화나트륨, 잔탄검, 정제수 **[성상]** 알루미늄 호일 파우치에 든 딸기향이 나는 흰색 또는 연한 노란색의 시럽제 **[효능·효과]** 기침, 가래 **[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.** 1) 만 3개월 미만의 영아[갓난아기] 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 **2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 않습니다.** 다른 진해거담제[기침·가래약], 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염[코염]용 경구제, 멀미약, 알레르기용약), 진정제 **3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.** 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자[노인], 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 – 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 **4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다.** 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 **5. 소아에 대한 투여** 만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다. **6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항** 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킵니다. **2) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.** 3) 복용시에는 음주하지 않습니다. **7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.** 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다. **※ 복용 시 포장 단면에 베일 수가 있으므로 주의하시기 바랍니다. ※ 흔들어서 복용하십시오.**

일반의약품

[용법·용량] 다음의 1회 용량을 1일 5~6회 복용한다. 약 4시간 간격을 두고 복용한다.
만 15세 이상 1회 20 mL (4포)
만 11세 이상 – 만 15세 미만
1회 13mL (2와 2/3포)
만 8세 이상 – 만 11세 미만
1회 10 mL (2포)
만 5세 이상 – 만 8세 미만
1회 6.5 mL (1과 1/3포)
만 3세 이상 – 만 5세 미만
1회 5mL (1포)
만 2세 이상 – 만 3세 미만
1회 4mL (4/5포)
만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[포장단위] 5 mL/포 X 10

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com) 나 전화(080-497-8273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템"nps://nedrug. mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품 안전관리원 (1644-6223) • 작성일자 : 2022. 04. 13. v.0001

8 806718 064523

[제조판매원]
daewon 대원제약
본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 44