



## 코막힘, 비염, 코감기

# 코닥원

코나에스  
나질스프레아액

### 일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약 100 mL 중

- 유효성분 : 자일로메타졸린염산염(USP) ..... 100 mg  
클로르페니라민말레산염(USP) ..... 250 mg
- 첨가제(보조제) : 벤잘코늄염화물 액 10mg(벤잘코늄염화물로서 9.5mg)
- 기타 첨가제 : D-스orbitol액, L-멘톨, 수크랄로스, 에데산나트륨수화물, 염화나트륨, 유칼립투스, 인산수소나트륨수화물, 인산이수소나트륨수화물, 정제수, 폴리옥실40경화피마유

[성상] 일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명한 액제

### [효능·효과]

코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 머리 무거움

### [용법·용량]

만 12세 이상 소아 또는 성인에게 1일 1~3회, 1회 1번씩 각 비강에 분무한다.  
연령 및 증상에 따라 적절히 증감하되 1일 3회를 초과하지 않고, 매회 최소 8시간 이상의 간격을 두고 적용한다.

### [사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 않습니다.
  - 만 12세 미만의 어린이
  - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
  - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
  - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
  - 지금까지 약(비염용 분무제 포함)에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진·발적, 부종, 자극감, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람
  - 고혈압, 심장질환, 당뇨병, 갑상선질환, 녹내장 환자
  - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
  - 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알 수 없으므로, 이 약은 의사, 치과의사, 약사의 지시·감독 하에 사용해야 한다.
  - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
  - 다음과 같은 기침이 있는 사람  
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는

- 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
    - 이 약의 사용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우  
발진·발적, 부종, 자극감, 가려움
    - 3일간 사용하더라도 증상이 좋아지지 않을 경우
  - 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
    - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
    - 이 약은 과도하게 사용하면 오히려 코막힘을 일으킬 수 있으므로 과도하게 사용하지 말 것.
    - 이 약은 비염용 분무제로만 사용하고, 눈과 귀에는 사용하지 말 것.
    - 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
    - 7일 이상 계속 사용하지 말 것.
    - 사용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작에 주의할 것.
    - 사용 시에는 음주하지 말 것.
    - 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 사용할 것.
    - 이 약은 벤잘코늄염화물을 함유하고 있어, 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 종창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.
  - 저장상의 주의사항
    - 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
    - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
    - 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장참조

[포장단위] 30 mL/병

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.daewonpharm.com](http://www.daewonpharm.com)) 나 전화(080-497-6273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용을 피하기 위해 : 한국약물관리안관리법 (1644-6223) • 작성일자 : 2022. 01. 07.

V-0006

[제조/의뢰자]

## Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386  
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

[제조자]

### (주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단로 47