



**[성상]** 알루미늄 호일 파우치에 든  
발기량이 나는 흰색 또는 연하  
노란색의 시럽제 **[효능효과]** 다음 증상의 일시적완화  
눈의가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구멍)의 가려움, 재채기,  
코막힘 및 부비동 울혈 **[사용상의 주의사항]** 1. 경고  
수도에페드린 함유 아이를 복용시 급성 전신성 발진성  
홍포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수  
있습니다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이  
관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와  
상의해야 합니다. 2. 다음 환자에는 투여하지 않습니다. 1)  
모노아민옥시다아제 억제제(MAO-아울중, 정신 및 감정장애,  
파킨슨병 치료제 중 일부를 투여중이거나 투여를 중지한지  
2주 이내인 사람 2) 만약 처방약에 모노아민옥시다아제  
억제제(MAO)의 포함 여부를 모를 경우, 이 약 복용 전에  
의사나 약사에게 문의합니다. 3. 다음 환자는 복용하기 전에  
의사, 약사와 상의합니다. 1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환,  
당뇨병, 녹내장, 또는 천식이나 만성기관지염과 같은 호흡  
장애가 있는 사람 2) 진정제 또는 신경안정제를 복용중인  
사람 4. 복용할 때 다음 사항을 주의합니다. 1) 권장량을  
초과하지 않습니다. 2) 이 약은 특히 어린이에게 흡분상태를  
유발시킬 수 있습니다. 3) 이 약은 현저한 졸음을 일으킬 수  
있으며, 진정제 및 신경안정제의 병용함께 복용으로  
졸음효과가 상승될 수 있습니다. 4) 불안, 어지러움 또는  
불면증이 생기면 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와  
상의합니다. 5) 급성 전신성 발진성 홍포증(AGEP), 발열, 홍반,  
다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응이 나타난 경우  
복용을 중지하고 의사·약사와 상의합니다. 6) 증상이 7일  
이내에 개선되지 않거나, 열이 나는 경우 복용을 중지하고  
의사·약사와 상의합니다. 7) 인후(목구멍)통이 2일 이상  
지속되거나 두통, 발열, 발진, 구역 또는 구토와 같은 증상이  
나타나는 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사·약사와 상의합니다.  
8) 수도에페드린 성분과 관련하여 하혈성 대장염의 증상(급격한  
복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우 이 약의 복용을 중단해야  
합니다. 5. 과량투여시의 처리 1) 부주의로 과량 복용 시, 즉시  
의사·약사와의 도움을 받습니다. 2) 아무런 증상이 나타나지  
않더라도 즉각적인 의학적 조치를 취합니다. 6. 소아에 대한  
투여 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한  
경우 의사의 진료를 받습니다. 7. 저장상의 주의사항 1)  
어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. 2) 약품을 원래  
용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 약품  
오염·잘못 사용에 의한 사고 발생이나 약품 품질 저하의  
원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

**[일반의약품]** 132 (아비과용제)  
**[성분·함량]** 이 약 1포(5mL)중  
·유효성분 : 클로르페니라민말레산염(KP)  
1 mg, 수도에페드린염산염(KP) 15 mg  
·첨가제 : (보존제) 벤조산나트륨(KP)  
3 mg/(기타) D-소르비톨 액, 농글리  
세린, 수크랄로스, 스테비오스이드, 에스  
스트로베릴에센스, 시트르산나트륨  
수화물, 시트르산수화물, 에틸민트향  
514165, 잔탄검, 정제수  
**[용법·용량]** 4-6시간마다 다음 용량을  
복용하고, 24시간 동안 4회를 넘지 않습니다.  

연령	체중	회 투여량
2-6세	11-21 kg	5 mL(1포)
6-12세	22-43 kg	10 mL(2포)
12세-성인	44 kg 이상	20 mL(4포)

  
만 2세 미만에게 투여하지 않습니다.  
다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를  
받습니다.  
**[저장방법]** 차광기밀용기, 25°C이하보관  
**[포장단위]** 5 mL/포 X 10  
※ 복용 시 포장 단면에 배일 수가  
있으므로 주의하시기 바랍니다.  
※ 흔들어서 복용하십시오.  
※ 어린이에게 투여할 경우에는  
보호자의 지도·감독하에 투여 하십시오.  
※ 본 의약품은 의사·약사의 처방 또는 품질관리(품질관리)에서  
생략하여 일정한 품질 관리를 할 필요성이 없습니다. 다만, 과다 사용(용량)한  
또는 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은  
구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여  
드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※  
장성(성인) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com) 나  
전화(02-44-6223)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 약품을 용이하게  
및 기타 자세한 의약품정보는 위메디안(www.wemedian.com) 또는  
의약품 정보를 참조하십시오. ※ 부작용, 피하주사, 신장, 천공(천공)  
안전관리원 (0644-6223) · 작성일자: 2019. 11. 11. V.0003  
**[제조판매업]**  
**Daewon** 대원제약  
본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386  
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24



담 당	PM	개 발	Q.A	자원팀	생산부