

# 레 가 셀

연질캡슐

카르두스마리아누스엑스 175mg

**I 성분·함량** : 이 약 1캡슐 중

카르두스마리아누스엑스(별규) ————— 175mg  
(실리빈으로서 60mg)

**I 성상**

연한 황갈색의 오일이 든 투명한 장방형 연질캡슐

**I 효능·효과**

다음 질환의 보조치료 : 독성 간질환, 만성간염, 간경변

**I 용법·용량**

성인 : 실리마린으로서 초기용량 1회 140mg (또는 실리빈으로서 1회 60mg),  
1일 3회, 유지용량 1회 70mg (또는 실리빈으로서 1회 30mg),  
1일 3회 [또는 1회 140mg (또는 실리빈으로서 60mg), 1일 2회]  
복용합니다.

**I 사용상의 주의사항**

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않습니다.
  - 심한 담도 폐쇄 환자
  - 이 약의 과민증 환자
  - 12세 이하의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. : 임부, 수유부
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다.
  - 드물게 위통 또는 설사.
  - 알레르기 반응
- 이 약의 복용시 주의할 사항
  - 정해진 용법 용량을 지킵니다.
  - 황달의 경우에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
  - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우나 장기복용시에는 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 저장상의 주의사항
  - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
  - 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관합니다.
  - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

**I 저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)