



코 속 먼지, 분비를 세척

코나프레쉬

나잘스프레이액
(염화나트륨)

일반의약품

[원료약품 및 그 분량] 이 약 100 mL 중

- 유효성분 : 염화나트륨(KP) 704 mg
- 첨가제(보존제) : 벤질코늄염화물 액 10mg(벤질코늄염화물로서 9.5mg)
- 기타 첨가제 : 무수인산일수소나트륨, 인산이수소나트륨, 정제수

[성상] 일정량씩 분무되는 용기에 든 무색 투명한 액제

[효능·효과]

- 코점막 분비물 또는 화농(궤양)성으로 인한 코막힘에 비강(코안)세척
- 비점막 건조증상의 완화

[용법·용량] 필요시 2~3시간마다 각 비강내(코안)에 분무(뿌림)

- 영아 : 1회 분무(뿌림)
- 1개월~12개월 : 1~2회 분무(뿌림)
- 1세~2세 : 1~3회 분무(뿌림)
- 2세~5세 : 1~4회 분무(뿌림)
- 5세~8세 : 1~5회 분무(뿌림)
- 8세~12세 : 1~6회 분무(뿌림)
- 성인 : 1~8회 분무(뿌림)

비강(코안)에 노즐을 삽입한 후 끝부분이 약간 뒤쪽으로 향하도록 한다. 펌프를 세게 눌러 분무제를 활성화시킨 다음 양쪽 비강(코안)으로 소정량을 분무(뿌림) 후 10초간 고개를 우측으로 젖힌 후 다시 좌측으로 10초간 젖힌다. 그 후 손으로 코를 꼭 잡고 비강(코안)을 막은 상태에서 10초간 고개를 앞으로 숙인다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 않는다.
벤질코늄염화물 또는 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 사람
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의한다.
1) 지금까지 점비약에 대하여 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 충창(부기), 자극감 등)을 일으킨 적이 있는 사람
2) 의사의 치료를 받고 있는 사람
3) 최근에 코 수술을 했거나, 병변이 있는 사람
3. 기타 이 약을 사용하는 동안 주의할 사항
1) 이 약은 점비용으로만 사용한다.
2) 위생상 한 제품은 한 사람만 사용한다.
3) 액이 후두나 인두로 흘러 들어가지 않도록 옆으로

비스듬히 눕거나 일어선 상태로 머리를 기울여서 사용한다.(후두로 들어갈 경우 후두 경련이 일어날 수 있다.)

- 4) 이 약은 벤질코늄염화물을 함유하고 있어, 기관지 경련을 일으킬 수 있으며, 특히 장기간 사용 시 비강 내 자극이나 충창(부기), 비강 점막의 부종을 유발할 수 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 열기를 피해 보관한다.
- 2) 사용기한이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 3) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 4) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 외부포장참조

[포장단위] 30mL/병

※ 본 의약품은 KGMP(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.daewonpharm.com) 나 전화(080-497-8273)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의약품 정보를 참조하세요. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원 (1644-6223) • 작성일자: 2022. 01. 07.

V0003

[제조의뢰자]

Daewon 대원제약

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386
공장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 1길 24

[제조자]

(주)퍼슨

충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 47