

# 다이트 정

(방풍통성산건조엑스)

Daewon 대한제약

# 다이트 정

(방풍통성산건조엑스)

## I 성분 · 함량 : 이 약 1정 중

- 유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.64→1)(별규).....237.5 mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 청색2호, 황색4호, 황색5호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이녹색(200F610000), 오파드라이흰색(OY-C-7000A), 이산화규소, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 덩크

## I 성상 : 녹색의 원형 필름코팅정

## I 효능 · 효과

배에 피하지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 홍조), 비만, 부기, 변비

## I 용법 · 용량

보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용합니다.

## I 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말아야 합니다.

- 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유조산의 위험이 있습니다.)
- 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단합니다.)

2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말아야 합니다.

다른 설사약

3. 다음 환자에는 신중히 투여합니다.

이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의해야 합니다.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 심장병 또는 신장병 환자
- 3) 부종 환자
- 4) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의해야 합니다.)
- 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 6) 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있습니다.)
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 9) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있습니다.)
- 10) 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있습니다.)
- 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 12) 배뇨장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있습니다.)
- 13) 감작성기능진중 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있습니다.)
- 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 15) 당뇨병 환자(마늘(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있습니다.)
- 16) 이 약은 황색5호(설테셀로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의합니다. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소

## 지해야 합니다.

### 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위일도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지해야 합니다.)
- (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지해야 합니다.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- (4) 피부 : 발진발적, 가려움 등이 나타나는 경우
- (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
- (6) 비뇨기계 : 배뇨장애
- (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP,  $\gamma$  - GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됩니다))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지해야 합니다.

### 2) 1개월(변비에 복용하는 경우 1주) 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

## 6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- (1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의해야 합니다.
- (2) 자극성 완화제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 합니다.
- (3) 정해진 용법·용량을 잘 지켜야 합니다. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의해야 합니다.
- (4) 다른 한약제제 등과 병용 투여할 경우 함유 성약의 중복에 주의해야 합니다. 대황 함유제제와 병용투여 시 특히 주의해야 합니다.
- (5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감삼산제제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프로필린)와 병용 시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감량하는 등 신중히 복용해야 합니다.
- (6) 칼륨함유제제, 갑조함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용시 위일도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용해야 합니다.

## 7. 저장상의 주의사항

- (1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관합니다(사용 후 반드시 밀폐 보관합니다).
- (2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- (3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

## I 저장방법 : 기밀용기, 실온보관 (1~30℃)

## I 사용기한 : 외부포장참조

## I 포장단위 : 360정/병

※ 본 의약품은 KGMF(의약품제조 및 품질관리기준)적격업체에서 생산하여 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품을 구입한 약국 등 판매업소에 한하여 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.  
※ 약은 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다. ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.daewonpharm.co.kr](http://www.daewonpharm.co.kr)) 나 전화(080-497-8272)에서 확인하실 수 있습니다.  
※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품사전(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보를 참조하세요.

• 작성일자 : 2017. 09. 14

I 제조회사

**Daewon** 대원제약주식회사

본사 : 서울특별시 성동구 천호대로 386  
공정 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 24

I 제조자

**우리들 제약**

본사 공장 : 경기도 화성시 향남읍  
제약공단 2길 50