

<분류번호 619>

[허가사항변경지시(의약품정책과-10174, 2019.9.10.)]

용법용량

보통 소아 체중 Kg당 7.5mg을 12시간마다(15mg/Kg/day) 투여한다. 투여기간은 보통 5 ~ 10일이다. 이 약은 음식물에 의한 생체이용율의 변화가 없으므로 식사와 관계없이 투여한다. 식사와 함께 또는 우유와 함께 복용할 수 있다
크레아티닌청소율이 30mL/min/1.73m²이하인 신부전 환자의 경우에는 용량을 절반으로 줄여야 한다. 이런 환자에게는 14일 이상 투여하지 않는다.

○ 마이코박테리아 감염증

소아 체중 Kg당 7.5 ~ 15mg을 12시간마다(15 ~ 30mg/Kg/day) 투여한다. 임상적 개선이 관찰되면 지속적으로 투여하여야 한다. 클래리트로마이신(역가)로서 1회 500mg(역가), 1일 2회를 초과하지 않는다. 에탐부톨, 클로파지민, 리팜핀과 같은 다른 항마이코박테리아제와 병용 투여하여야 한다.

<이 약의 조제법>

적량의 물을 넣고 잘 흔들어 용해시킨다. 조제된 이 약의 농도는 250mg/5mL이다.

포장단위	물의 양	조제된 총용량	조제된 농도
2,500mg/50mL	27mL	50mL	250mg/5mL
3,500mg/70mL	37mL	70mL	250mg/5mL
5,000mg/100mL	53mL	100mL	250mg/5mL
7,000mg/140mL	74mL	140mL	250mg/5mL

조제된 약은 15 ~ 30℃에서 보관하고(냉장보관 하지 말 것.), 14일 이내에 사용한다. 투여하기 전에 흔들어 사용한다.