

의약품 허가사항 변경 안내

- 식품의약품안전처에 의해 아래와 같이 “콜대원코나에스나잘스프레이액”의 허가사항이 변경되어 해당내용을 안내 드립니다.
- 의약품의 안전한 사용을 위하여, 판매 시 소비자에게 변경사항을 지도 부탁드립니다.

▶ **제품명 : 콜대원코나에스나잘스프레이액**

▶ **변경사항 : 용법용량, 사용상의주의사항 (아래 변경대비표 참조)**

변경 전	변경 후
<p>- 용법용량</p> <p>만 <u>7세</u> 이상 소아 또는 성인에게 1 일 1~3 회, 1 회 1 번씩 각 비강에 분무한다.</p> <p>연령 및 증상에 따라 적절히 증감하되 1 일 <u>6회</u> 초과하지 않고, 매회 최소 <u>3 시간</u> 이상의 간격을 두고 적용한다.</p>	<p>- 용법용량</p> <p>만 <u>12세</u> 이상 소아 또는 성인에게 1 일 1~3 회, 1 회 1 번씩 각 비강에 분무한다.</p> <p>연령 및 증상에 따라 적절히 증감하되 1 일 <u>3회</u>를 초과하지 않고, 매회 최소 <u>8 시간</u> 이상의 간격을 두고 적용한다.</p>
<p>- 사용상의주의사항</p> <p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 않습니다.</p> <p>1) 만 <u>7세</u> 미만의 어린이</p> <p>2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.</p> <p><u><신설></u></p>	<p>- 사용상의주의사항</p> <p>1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 않습니다.</p> <p>1) 만 <u>12세</u> 미만의 어린이</p> <p>2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.</p> <p><u>5) 수유부 : 이 약이 모유로 분비되는지 알 수 없으므로, 이 약은 의사, 치과의사, 약사의 지시·감독하에 사용해야 한다.</u></p>